

মেলোসিন প্লাস (ভেট)

মেলোক্সিকাম বিপি ও প্যারাসিটামল বিপি

উপাদানঃ

ইনজেকশনঃ প্রতি মিলিতে আছে মেলোক্সিকাম বিপি ২০ মি.গ্রা. ও প্যারাসিটামল বিপি ১৫০ মি.গ্রা.।

বোলাসঃ প্রতি বোলাস এ আছে মেলোক্সিকাম বিপি ১০০ মি.গ্রা. ও প্যারাসিটামল বিপি ১৫০০ মি.গ্রা.।

বিবরণঃ

মেলোক্সিকাম অক্সিকেম ফ্যামিলির একটি নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ঔষধ। ইহা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সংশ্লেষণে বাধা প্রদানের মাধ্যমে প্রদাহ বিরোধী, এগজুডেট বিরোধী, ব্যথানাশক এবং জ্বররোধী ঔষধ হিসাবে কাজ করে। মেলোক্সিকামের এন্টি-এন্ডোটক্সিক বিরোধী গুণ রয়েছে। প্যারাসিটামল একটি জ্বররোধী ঔষধ। এটি হাইপোথ্যালামাসের তাপ উৎপাদনকারী কেন্দ্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নির্দেশনাঃ

মেলোসিন প্লাস (ভেট) প্রদাহ, ব্যথা, জ্বর, খোড়ানো, শিং কাটা ও খোঁজাকরণে ব্যবহার্য। এছাড়াও তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া ও তীব্র ম্যাসটাইটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগী চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধিঃ

ইনজেকশন-

মাংসপেশী/ চামড়ার নীচে/শিরায় প্রয়োগের জন্য।

গবাদি প্রাণীঃ ১ মি.লি./৪০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য কেবলমাত্র একবার ইনজেকশন দিতে হবে।

বোলাসঃ

বড় প্রাণীঃ ১টি বোলাস/২০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য দিনে একবার।

ছোট প্রাণীঃ ১/৪-১/২ টি বোলাস দিনে এক বার।

অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনাঃ

মেলোক্সিকাম এর প্রতি সংবেদনশীল প্রাণীতে ব্যবহার অনুচিত। বৃক্ক, যকৃত ও হৃদরোগে আক্রান্ত প্রাণীতে ব্যবহার অনুচিত।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণীতে ব্যবহারঃ

মেলোসিন প্লাস (ভেট) গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণীতে ব্যবহার অনুচিত।

সতর্কতাঃ

মেলোসিন প্লাস (ভেট) স্টেরয়েড অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (SAID) বা অন্যান্য নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (NSAID) ঔষধের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিলে ইনজেকশনের স্থান সাময়িক ফুলে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রে ক্ষত, অরুচি, বমি এবং ডায়রিয়া হতে পারে।

ড্রাগ ইন্টারেকশনঃ

কার্টিকোস্টেরয়েড, হেপারিন, ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন, ফ্লুনিড্রিন এবং ফিনাইলবিউটাঙ্গোনের সাথে একত্রে ব্যবহারে রক্তক্ষরণ দীর্ঘায়িত হতে পারে।

প্রত্যাহারকালঃ

মেলোসিন প্লাস (ভেট) ব্যবহারের পর উক্ত প্রাণীর মাংস ১৫ দিন এবং দুধ ৫ দিন পর্যন্ত সেবন করা যাবেনা।

সংরক্ষণঃ

৩০° সেঃ তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

ইনজেকশন-১০ মি.লি. ভায়ালে সরবরাহ করা হয়।

বোলাস- প্রতিটি বাক্সে ১০×২ টি বোলাস অ্যান্ড পিভিসি/পিভিডি সিস্টারে সরবরাহ করা হয়।



Manufactured by

SHINIL Pharma Ltd.
BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh

Meloshin Plus (Vet)

Meloxicam BP & Paracetamol BP

Composition:

Injection: Each ml contains Meloxicam BP 20 mg & Paracetamol BP 150 mg.

Bolus: Each bolus contains Meloxicam BP 100 mg & Paracetamol BP 1500 mg.

Description:

Meloxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of oxycam family. It acts by inhibiting prostaglandin synthesis, thereby exerting anti-inflammatory, anti-exudative, analgesic and antipyretic properties. Meloxicam has anti-endotoxic properties too. Paracetamol is an antipyretic agent. It reduces fever by depressing the heat regulatory centers in the hypothalamus.

Indication:

Meloshin Plus (Vet) is indicated in inflammation, pain, fever, lameness, dehorning & castration. It is also used as supportive therapy in acute respiratory infections, diarrhoea, acute mastitis etc.

Dosage & administration:

Injection

For intramuscular/subcutaneous/intravenous administration.

Livestock: 1 ml / 40 kg body weight as a single dose.

Bolus

Large Animal: 1 bolus/200 kg body weight once daily.

Small Animal: 1/4 - 1/2 bolus once daily.

Or, as directed by the registered Veterinarian.

Contraindications:

Animals that hypersensitive to Meloxicam or those have kidney, liver & cardiac problem.

Use in pregnancy & lactation:

Not recommended for use in pregnant or lactating animals.

Precaution:

Do not administer concurrently with steroidal anti-inflammatory drugs (SAID) & other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID).

Side effects:

A slight transient swelling at the injection site following SC injection may be seen. Prolong use may cause gastrointestinal lesions, inappetence, vomiting and diarrhoea.

Drug interactions:

May cause increased likelihood of bleeding if use in conjunction with Corticosteroids, Heparin, Warfarin, Aspirin, Flunixin & Phenylbutazone.

Withdrawal Period:

After using **Meloshin Plus (Vet)** meat should not be eaten for 15 days and milk for 5 days.

Storage:

Store at a temperature below 30° C, protect from light & dry place. Keep all medicines out of reach of children.

Pack Size:

Injection: 10 ml Vial.

Bolus: Each box contains 10 x 2's bolus in Alu-PVC/PVDC blister.



Manufactured by

SHINIL Pharma Ltd.
BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh