

H : 170 mm

W : 92 mm

এস-জল বোলাস (ভেট)

এলবেনডাজল বিপি ৬০০ মি.গ্রা.

উপাদান:

প্রতিটি বোলাসে আছে এলবেনডাজল বিপি ৬০০ মি.গ্রা.।

বিবরণ:

এলবেনডাজল হল একটি সিনথেটিক অ্যাঙ্থেলমিন্টিক যা বেনজিমিডাজল-ডেরিভেটিভ গ্রুপের কুমিনাশক যারা কুমির বিরুদ্ধে বিস্তৃত কার্যপদ্ধতিসহ উচ্চ মাত্রায় প্রাপ্তবয়স্ক লিভারফ্লুকের বিরুদ্ধে কাজ করে।

নির্দেশনা:

বাছুর, গরু এবং ছাগলের কুমি সংক্রমণের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় যেমন: গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল কুমি: বুনোস্টোমাম, কোপিরিয়া, চ্যাবেরিয়া, হ্যামোনচাস, নেমাতোডাইরাস, ওসোফাগোস্টোমাম, ওস্টেরটাগিয়া, ফ্রিঞ্জাইলয়ডিস এবং ট্রাইকোস্ট্রাইলাস এসপিপি।

ফুসফুসের কুমি: ডিকটিওকুলাস ভিভিপারাস এবং ডি ফিলিয়ারিয়া।

টেপওয়ার্ম: মনিজা এসপিপি।

কলিজা কুমি: প্রাপ্তবয়স্ক ফ্যাসিওলা হেপাটিকা।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

শুধু মাত্র মুখে খাওয়ানোর জন্য।

বাছুর/গরু- ১ বোলাস/১২০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য।

কলিজা কুমি- ১ বোলাস/৭০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য।

ভেড়া/ছাগল- ১ বোলাস/৭০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য।

অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনা:

কলিজা কুমির চিকিৎসায় ১৪ দিনের মধ্যে এবং তিন মাসের কম বয়সের প্রাণীতে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

মারাত্মক ফুসফুসের কুমিতে আক্রান্ত গরুতে এলার্জি দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালীন ব্যবহার:

এস-জল বোলাস (ভেট) গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি করে না।

প্রত্যাহারকাল:

এস-জল বোলাস (ভেট) ব্যবহার করার পর উক্ত প্রাণীর দুধ-৪ দিন এবং মাংস-১২ দিন পর্যন্ত সেবন করা যাবে না।

সংরক্ষণ:

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ:

প্রতিটি বাক্সে আছে ৫ x ৪ টি বোলাস ব্লিস্টার স্ট্রীপে সরবরাহ করা হয়।



প্রস্তুতকারক

সিনিল ফার্মা লি.

বিকে বাড়ি, মির্জাপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ

S-Zol Bolus (Vet)

Albendazole BP 600 mg

Composition:

Each bolus contains Albendazole BP 600 mg.

Description:

Albendazole is a synthetic anthelmintic which belongs to the group of benzimidazole-derivatives with activity against a broad range of worms and at a higher dosage level also against adult stages of liver fluke.

Indications:

Prophylaxis and treatment of worm infections in calves, cattle sheep and goats like:

Gastrointestinal worms : Bunostomum, Cooperia, Chabertia, Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Strongyloides and Trichostrongylus spp.

Lung worms: Dictyocaulus viviparus and D. filaria.

Tapeworms: Moniezia spp.

Liver-fluke: adult Fasciola hepatica.

Dosage and Administration:

For oral administration:

Calves/Cattle- 1 bolus/120 kg body weight.

Liver fluke- 1 bolus/70 kg body weight.

Sheep/Goats- 1 bolus/70 kg body weight.

Or, as directed by the registered Veterinarian.

Contraindications:

Liverworm treatment should not be used within 14 days and in animals less than three months of age.

Side Effects:

Cows infected with deadly lungworms can develop allergies.

Use During Pregnancy and Lactation:

S-Zol Bolus (Vet) is safe to use during pregnancy and lactation.

Withdrawal Period:

After using S-Zol Bolus (Vet) milk should not be eaten for 4 days & meat 12 days.

Storage:

Store at a temperature below 30° C, protect from light & dry place.

Keep all medicines out of reach of children.

Pack Size:

Each box contains 5 x 4's bolus in blister strip.



Manufactured by

SHINIL Pharma Ltd.

BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh