

# শিফ্লু

ইনজেকশন  
(ভেট)

ফ্লুনিব্রিন মেথ্রামিন ইউএসপি

## উপাদানঃ

প্রতি মি.লি. তে আছে

ফ্লুনিব্রিন মেথ্রামিন ইউএসপি ৮৩ মি.গ্রা. যা ৫০ মি.গ্রা. ফ্লুনিব্রিন এর সমতুল্য।

## নির্দেশনাঃ

**গবাদিপ্রাণী:** অভ্যন্তরীণ বিষক্রিয়া, তীব্র ওলান প্রদাহ এবং শ্বসনতন্ত্রের রোগজনিত জ্বর জ্বর ভাব ও ব্যথা নিরাময় করে। অভ্যন্তরীণ বিষক্রিয়াজনিত প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

**ঘোড়া:** পেশী-কঙ্কালতন্ত্রের অস্বাভাবিকতায় সৃষ্ট ব্যথা ও প্রদাহ দূর করে। এছাড়াও ঘোড়ার পেট ব্যথার সঙ্গে যুক্ত অন্ত্রেরও ব্যথা নিরাময় করে।

## মাত্রা ও প্রয়োগবিধিঃ

**গবাদিপ্রাণী-** ২ মিলি প্রতি ৪৫ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য শিরাপথে দিনে ১ বার করে ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

**ঘোড়া-** ১ মিলি প্রতি ৪৫ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য শিরাপথে বা গভীর মাংসপেশীতে দিনে ১ বার করে ৫ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

## প্রত্যাহারকালঃ

মাংস- ৪ দিন, দুধ- ২৪ ঘন্টা

## ব্যবহার করার পূর্বে সতর্কতা:

- ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য
- ফ্লুনিব্রিন মেথ্রামিনের প্রতি সংবেদনশীল প্রাণিতে ব্যবহার অনুচিত
- মাত্রা ও প্রয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে
- শিরা পথে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে
- দীর্ঘমেয়াদী নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ব্যবহারের ফলে গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল আলসার হতে পারে
- ঘোড়ায় শিরা পথে প্রয়োগের ফলে এনাফাইলেকটিক প্রতিক্রিয়া ও ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে
- মাংসে প্রয়োগের সময় প্রয়োগ স্থানে প্রদাহ হতে পারে

## ব্যবহারকারীর বিশেষ সতর্কতা:

- সরাসরি শরীরের স্পর্শ থেকে এড়িয়ে চলুন
- ব্যবহারের পর হাত ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন

## সংরক্ষণঃ

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## সরবরাহঃ

১০ মি.লি. ও ৫০ মি.লি. কাঁচের ভায়ালে সরবরাহ করা হয়।



Manufactured by

**SHINIL Pharma Ltd.**

BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh

# Shiflu

Injection  
(Vet)

Flunixin Meglumine USP

## Composition:

Each ml injection contains

Flunixin Meglumine USP 83 mg Eqv. to 50 mg Flunixin.

## Indications:

**Cattle:** For the control of pyrexia associated with bovine respiratory disease, endotoxemia and acute bovine mastitis. Also for the control of inflammation in endotoxemia.

**Horse:** For the alleviation of inflammation and pain associated with musculoskeletal disorders. Also for the alleviation of visceral pain associated with colic in the horse.

## Dosage and Administration:

### Cattle-

Administer 2 ml per 45 kg body weight by IV route once a day for up to 3 days.

### Horse-

Administer 1 ml per 45 kg body weight by IV or IM route once a day for up to 5 days.

## Withdrawal Period:

Meat-4 days, Milk- 24 hours.

## Precautions before using:

- Use under recommendation of Veterinarian
- Do not use to animals showing hypersensitivity to Flunixin Meglumine.
- Keep the recommended usage and dosage.
- The drug should be given slowly when used intravenously.
- Long-term treatment with NSAIDs might induce gastro-intestinal ulceration
- In horses, rare instances of anaphylactic-like reactions right after IV use and loss of appetite have been reported.
- Tissue irritation at the injection site may occur when it is injected intramuscularly

## Precautions for the people who use the product for the animals:

- Avoid direct contact with the skin
- Wash hands properly after use

## Storage:

Store at a temperature below 30° C, protect from light & keep in dry place. Keep all medicines out of reach of children.

## Pack Size:

Glass vial of 10 ml. & 30 ml



Manufactured by

**SHINIL Pharma Ltd.**

BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh