

সিমার

বোলাস
(ভেট)
মারবোফ্লক্সাসিন বিপি

বর্ণনা:

সিমার বোলাস (ভেট) তৃতীয় প্রজন্মের ফ্লোরোকুইনোলন গ্রুপের ব্রড স্পেকট্রাম ব্যাকটেরিসাইডাল এক্টিভাইক্রোবিয়াল যা গ্রাম পজেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং মাইকোপ্লাজমা এর বিরুদ্ধে কার্যকর।

উপাদান:

প্রতিটি বোলাসে আছে মারবোফ্লক্সাসিন বিপি ৫০ মি.গ্রা।

কার্যপদ্ধতি:

সিমার বোলাস (ভেট) একটি ব্যাকটেরিসাইডাল এক্টিভায়োটিক, যা সক্রিয়ভাবে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ গাইরেজ এনজাইম এবং টপোআইসোমারেজ-IV এনজাইমকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

নির্দেশনা:

সিমার বোলাস (ভেট) শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রমণ, ডায়রিয়া ও পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ, ই. কলাই দ্বারা সৃষ্ট বাছুরের পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ এবং তীব্র ওলান প্রদাহ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

বাছুর- ১ টি বোলাস/৫০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য (১ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে) পরপর ৩ দিন।
কুকুর/বিড়াল- ১ টি বোলাস/১৮ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য (২.৭৫ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে) পরপর ৩ দিন।

অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

প্রতিনির্দেশনা:

যে সকল প্রাণীর মারবোফ্লক্সাসিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এবং যে সকল ব্যাকটেরিয়া অন্যান্য ফ্লোরোকুইনোলন এর প্রতি রেজিস্ট্যান্ট তাদের ক্ষেত্রে সিমার বোলাস (ভেট) প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া- বমি, ডায়রিয়া এবং ক্ষুধামান্দ্য।

বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া- কখনো কখনো চিকিৎসা পরবর্তীতে সবুজাভ মল দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালীন ব্যবহার:

সিমার বোলাস (ভেট) গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রত্যাহারকাল:

সিমার বোলাস (ভেট) ব্যবহারের পরে উক্ত প্রাণীর মাংস ০৬ দিন এবং দুধ ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত সেবন করা যাবে না।

সংরক্ষণ:

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিক্রয়/সেবন যোগ্য।

ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণের অধিক ব্যবহার করা যাবে না।

চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করুন।

সরবরাহ:

প্রতি বাক্সে ৫×৪ টি বোলাস অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার স্ট্রিপে সরবরাহ করা হয়।

Manufactured by
SHINIL Pharma Ltd.
BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh

Simar

Bolus
(Vet)
Marbofloxacin BP

Description:

Simar Bolus (Vet) belongs to 3rd generation Fluroquinolone with broad spectrum bactericidal antimicrobial activity towards gram positive, gram negative bacteria and mycoplasma.

Composition:

Each bolus contains Marbofloxacin BP 50 mg.

Mode of Action:

Simar Bolus (Vet) is a bactericidal antibiotic, actively killing bacteria by inhibiting bacterial DNA gyrase and the Topoisomerase-IV enzyme.

Indications:

Simar Bolus (Vet) is indicated for the treatment of severe respiratory tract infections, diarrhoea and gastro-enteritis, neonatal gastro-enteritis caused by *E. coli* & acute mastitis.

Dosage & Administration:

Calves- 1 bolus/50 kg body weight (as 1 mg/kg body weight) for 3 consecutive days.

Dogs & Cats- 1 bolus/18 kg body weight (as 2.75 mg/kg body weight) for 3 consecutive days.

Or, as directed by the registered Veterinarian.

Contraindications:

Simar Bolus (Vet) is not recommended for use in animals with known hypersensitivity to Marbofloxacin & in case of resistant bacteria to other Fluroquinolones.

Side Effects:

Common side effects- Vomiting, diarrhoea & lack of appetite.

Rare side effects- A greenish retroceding coloring of faeces at the end of treatment has been shown sometimes.

Use in Pregnancy & Lactation:

Simar Bolus (Vet) may be used safely during pregnancy and lactation.

Withdrawal Period:

After using Simar Bolus (Vet) meat should not be eaten for 06 days & milk 36 hours.

Storage:

Store at a temperature below 30° C, protected from light & keep in dry place. Keep all medicines out of reach of children.

To be disbursed as per prescription of registered Veterinarian only.

Don't use the medicine more than prescribed amount.

Complete the full course as advised by the Veterinarian.

Pack Size:

Each box contains 5×4's bolus in a Alu-Alu blister strip.

Manufactured by
SHINIL Pharma Ltd.
BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh